

الإسعافات الأولية للربو

1



أجس الشخص في وضع عامودي

- كن هادئًا ومطمئنًا
- لا تتركه بمفرده

2



أعطه 4 بخات منفصلة من البخاخة المسعفة الزرقاء/الرمادية

- هز البخاخة
- ضع بخة واحدة في أنبوب المبادعة
- خذ 4 استنشاقات من أنبوب المبادعة
- - كزر حتى تأخذ 4 بخات

أو إعط استنشاقين منفصلين من Bricanyl (بريكانيل) (6 سنوات أو أكبر)
أو إعط استنشاق واحد من Symbicort Turbuhaler (سيمبيكورت تيريوهالور) (12 سنة أو أكبر)
أو إعط بختين من Symbicort Rapihaler (سيمبيكورت تيريوهالور) من خلال أنبوب المبادعة (12 سنة أو أكبر)
في حالة عدم توفر أنبوب مبادعة: خذ بخة واحدة بينما تأخذ نفسًا بطنيًا وعميقًا واحبس أنفاسك طالما أنك مرتاح. كزر حتى يتم إعطاء كل البخات

3



انتظر 4 دقائق

- إذا لم يكن هناك تحسن، أعط 4 بخات أخرى منفصلة من البخاخة المسعفة الزرقاء / الرمادية على النحو الوارد أعلاه

أو إعط استنشاق واحد آخر من Bricanyl
أو إعط استنشاق واحد آخر من Symbicort Rapihaler
أو إعط بختين من Symbicort Rapihaler عن طريق أنبوب المبادعة

ومع ذلك إذا لم يكن هناك أي تحسن

4



اتصل بثلاثة أصفار (000)

- قل "ambulance" وأن شخصًا يتعرض لنوبة ربو
- استمر في إعطاء 4 بخات منفصلة كل 4 دقائق حتى وصول المساعدة الطارئة
- أو إعط استنشاقين من Bricanyl أو Symbicort Turbuhaler كل 4 دقائق
- بعد أقصى 4 استنشاقات أخرى من Symbicort Turbuhaler أو إعط بختين من Symbicort Rapihaler من خلال أنبوب المبادعة كل 4 دقائق-
- كحد أقصى 8 بخات أخرى من Symbicort Rapihaler

خدمة الترجمة الكتابية
والشفهية
131 450



ASTHMA
AUSTRALIA

1800 ASTHMA
(1800 278 462)

aSthma.org.au

©Asthma AuStralia 2020

اتصل على الفور بخط المساعدة في حالات الطوارئ بالرقم ثلاثة أصفار (000) إذا:

- كان الشخص لا يتنفس
- تفاقمت حالة الربو عند الشخص فجأة أو ازدادت سوءاً
- تعرض الشخص لنوبة ربو ولا يتوفر علاج مسعف
- أنت غير متأكد ما إذا كانت الحالة هي حالة ربو أم لا
- معروف أن هذا الشخص يعاني من الحساسية المفرطة - اتبع خطة العمل الخاصة به للتعامل مع الحساسية المفرطة (Anaphylaxis Action Plan)، ثم قَدِّم الإسعافات الأولية لنوبة الربو من غير المحتمل أن يضر الدواء المسعف الأزرق/الرمادي، حتى لو لم يكن الشخص مصابًا بالربو.